

Số: /SYT-NVYD

Kon Tum, ngày tháng 3 năm 2022

V/v kê đơn thuốc điều trị cho  
người mắc COVID-19

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19" ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị:

1. Phổ biến nội dung Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19" ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế đến các bác sĩ của đơn vị biết, thực hiện kê đơn điều trị cho người bệnh mắc COVID-9 đủ các điều kiện theo quy định chuyên môn.

2. Chỉ đạo các Trạm Y tế/Trạm Y tế lưu động, phòng khám đa khoa khu vực hoặc phòng khám thuộc Trung tâm Y tế nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại các mức độ mắc bệnh COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp đầy đủ các điều kiện để chẩn đoán mắc COVID-19 theo hướng dẫn tại Văn bản số 643/SYT-NVYD ngày 09/02/2022, các bác sĩ kê đơn thuốc Molnupiravir ngoại trú cho người mắc COVID-19 điều trị tại nhà, thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế và khuyến cáo của nhà sản xuất (lưu ý đóng dấu treo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tránh tình trạng lạm dụng).

Công văn này thay thế cho Công văn số 1011/SYT-NVYD ngày 01/3/2022 của Sở Y tế. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVYD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Ái**

**Phụ lục**  
**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC MOLNUPIRAVIR**

1. Dùng cho bệnh nhân COVID-19 người lớn từ 18 tuổi trở lên **mức độ nhẹ đến trung bình** và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

2. Thuốc sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân cần nhập viện đã được khởi trị molnupiravir trước đó có thể tiếp tục sử dụng thuốc để hoàn thành phác đồ điều trị 5 ngày tùy theo quyết định của bác sĩ điều trị.

3. Chống chỉ định: Quá mẫn với molnupiravir hay bất kỳ thành phần nào của thuốc

4. Liều dùng: 800 mg/lần, uống x 2 lần/ngày.

- Thời gian điều trị: 5 ngày

**Chú ý:**

- Không khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi do quan ngại nguy cơ độc tính trên thai nhi, trên xương, sụn của thuốc.

- Phụ nữ có khả năng mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và có hiệu quả trong quá trình điều trị và trong vòng 04 ngày sau khi sử dụng liều molnupiravir cuối cùng.

- Phụ nữ cho con bú: không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong vòng 04 ngày sau khi sử dụng liều molnupiravir cuối cùng.

- Đối với nam giới trong độ tuổi sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và hiệu quả trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều molnupiravir cuối cùng.

- Thông tin chi tiết về thuốc thực hiện theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc được Bộ Y tế phê duyệt.